

Qu'est-ce que la coélioscopie ?

La coélioscopie est actuellement l'une des interventions chirurgicales les plus fréquemment réalisées en gynécologie. Elle permet de visualiser l'ensemble des organes pelviens et abdominaux.

Le principe est le suivant. Sous anesthésie générale, on réalise une petite incision (10 mm) au niveau de l'ombilic qui permet :

- l'insufflation de gaz (CO_2) dans la cavité abdominale;
- l'introduction par la même incision, d'un tube optique relié à un système de vidéo caméra permettant de voir les organes.

La coélioscopie permet de diagnostiquer certaines lésions et parfois de réaliser, dans le même temps, le traitement chirurgical de ces lésions. La coélioscopie opératoire ou coélio-chirurgie permet de réaliser dans un certain nombre de cas une chirurgie "à ventre fermé". Les instruments sont introduits par l'intermédiaire de 2 ou 3 orifices de 5 mm de diamètre, au niveau de la cavité abdominale, permettant ainsi au chirurgien de traiter différentes lésions.

Quelles interventions peuvent être réalisées par coelioscopie ?

La coelioscopie permet de réaliser des gestes opératoires variés :

En chirurgie gynécologique :

- traitement des grossesses extra-utérines,
- traitement des kystes ovariens,
- chirurgie de l'endométriose : destruction des lésions, libération d'adhérences,
- chirurgie de la stérilité lorsque celle-ci est due à une atteinte des trompes au niveau du pavillon,
- traitement de certains fibromes,
- ect...

En chirurgie digestive :

- appendicectomie,
- cholécystectomie : ablation de la vésicule biliaire,
- ect...

Néanmoins, des difficultés opératoires inattendues, la découverte de lésions plus importantes, peuvent conduire votre chirurgien à abandonner la chirurgie par coelioscopie et à procéder à une intervention dite classique en ouvrant l'abdomen (laparotomie).

Quels sont les avantages de la coelioscopie opératoire ?

Les avantages par rapport à la chirurgie classique sont nombreux :

- absence d'ouverture de la cavité abdominale, d'où une absence de cicatrice et un intérêt esthétique,
- durée d'hospitalisation plus courte,
- suites post-opératoires plus confortables et reprise plus rapide de l'activité.

Les complications de la coelioscopie opératoire sont très rares. Certaines douleurs comme des douleurs au niveau des épaules sont normales, et doivent s'estomper en 24 à 48 heures.

Néanmoins, lors de votre retour à domicile, certains signes, tels que température supérieure à 38°C, troubles urinaires, diarrhées, constipation, vomissements, pertes anormales, doivent vous amener à consulter un médecin.