

Prévention de la coqueluche

La coqueluche peut être une maladie fort grave chez les jeunes bébés.

Les adultes peuvent attraper la coqueluche et la transmettre sans le savoir.

Les jeunes parents sont la source de transmission aux bébés dans la moitié des cas.

Même si vous avez fait la coqueluche auparavant ou si vous êtes vaccinés, la protection contre cette maladie diminue avec le temps.

Les adolescents et les adultes ont donc besoin d'une vaccination de rappel afin d'éviter d'attraper la coqueluche et de la transmettre aux nourrissons non protégés.

Votre bébé sera vacciné contre la coqueluche grâce au schéma de vaccination de base (8, 12 et 16 semaines).

Mais tant que votre bébé n'a pas reçu le programme complet de vaccination, il risque d'être infecté par la coqueluche.

Pour protéger votre bébé durant cette période, le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination de tous les membres de la famille (vaccination « cocoon ») :

Le père, les frères, les sœurs et tous les adultes en contact régulier avec le bébé durant la première année de vie, devraient être vaccinés avant la naissance du bébé, ou sinon le plus rapidement possible après la naissance.

La future mère ou la mère devrait être vaccinée avant la grossesse ou sinon pendant le troisième trimestre de la grossesse ou sinon le plus rapidement possible après la naissance.

Si la Maman n'a pas été vaccinée avec certitude avant ou pendant la grossesse, elle recevra la vaccin durant son séjour à la Maternité.

N'hésitez pas à en parler si vous avez des questions à ce propos.