

## Quels traitements propose-t-on ?

Le traitement est souvent entrepris rapidement, car le CIS peut vite s'étendre. Une association de différents traitements sera nécessaire, en commençant par de la chimiothérapie, suivie par de la chirurgie et des rayons (radiothérapie). Si les cellules cancéreuses y sont sensibles, des nouveaux traitements ciblés et/ou de l'hormonothérapie seront également prescrits.

La combinaison de traitements doit être établie au cas par cas, par une équipe médicale spécialisée (consultation multidisciplinaire), en tenant compte des caractéristiques du cancer, mais aussi de l'âge et de l'état général de la patiente.



## A qui en parler ?

Vous cherchez de l'aide ou d'autres informations ?  
Vous avez besoin de parler ?  
Vous cherchez des informations sur un type de cancer ou ses possibilités de traitement ?  
Vous voulez savoir comment faire appel à un service de la Fondation contre le Cancer ?

Dans ce cas, appelez Cancerinfo gratuitement et de façon anonyme (du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00).

Des professionnels (médecins, psychologues, infirmiers et assistants sociaux) sont à l'écoute de toute personne confrontée au cancer.

# Cancerinfo

POUR TOUTES VOS QUESTIONS SUR LE CANCER

 0800 15 801

 [cancer.be/info](http://cancer.be/info)

 publications



Avec le soutien de  **FOUNDATION  
BNP PARIBAS FORTIS**

  
Fondation  
contre le Cancer


Fondation d'utilité publique  
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles  
T. 02 736 99 99  
info@cancer.be - www.cancer.be  
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

 Suivez-nous sur  
[www.facebook.com/fondationcontrelecancer](http://www.facebook.com/fondationcontrelecancer)



Fondation  
contre le Cancer

## Le cancer inflammatoire du sein



## De quoi s'agit-il ?

Le cancer inflammatoire du sein (CIS) est une forme rare mais particulièrement agressive de cancer du sein. Il représente moins de 5 % de tous les cancers du sein.

Lorsqu'il est détecté, le CIS est souvent à un stade avancé. Il se développe beaucoup plus rapidement que les autres cancers du sein. Un CIS peut notamment apparaître de façon rapide en quelques semaines. Au moment du diagnostic, un CIS s'est souvent déjà propagé aux ganglions.

En raison de cette forte agressivité et de sa rapidité de développement, la survie des femmes atteintes d'un cancer inflammatoire du sein est nettement moins bonne que pour les autres formes de cancer du sein.

A la différence de la plupart des cancers du sein, qui provoquent l'apparition d'une ou plusieurs tumeurs solides distinctes, le CIS a plutôt tendance à se développer en infiltrant les tissus de la peau.

## Comment se manifeste-t-il ?

Les symptômes d'un cancer inflammatoire du sein sont différents des anomalies constatées dans les formes habituelles de cancer du sein. Habituellement, il n'est pas palpable (absence de "boule" anormale), mais s'accompagne de modifications visibles ou perceptibles par la femme elle-même.

Les cellules cancéreuses du CIS vont rapidement envahir les vaisseaux lymphatiques (vaisseaux qui drainent le sein et la peau) et les obstruer. C'est ce blocage des vaisseaux lymphatiques qui provoque les premiers symptômes du cancer inflammatoire du sein.

Voici une liste d'anomalies (il peut y en avoir une seule ou plusieurs à la fois) auxquelles il faut être attentive :

- une augmentation soudaine du volume d'un sein,
- une rougeur du sein,
- une sensation de chaleur dans un sein,
- une douleur dans le sein,
- une démangeaison persistante dans le sein,
- un durcissement ou un épaissement de la peau du sein, l'apparition d'une "peau d'orange",
- un gonflement des ganglions sous le bras ou à la base du cou,
- une rétraction inhabituelle du mamelon ou un écoulement.

**Aucune de ces anomalies ne signifie automatiquement la présence d'un cancer inflammatoire du sein**, mais si vous constatez une ou plusieurs d'entre elles, demandez l'avis de votre médecin. **Vous êtes en première ligne pour constater un changement au niveau d'un de vos seins.** La rapidité du diagnostic dépend donc aussi de vous !

## Comment s'effectue le diagnostic ?

Un cancer inflammatoire du sein peut facilement être confondu avec une inflammation bénigne du sein, appelée "mastite". Mais les symptômes d'un CIS ne seront pas améliorés par des antibiotiques, contrairement à ceux d'une mastite classique. Autre différence : une mastite s'accompagne souvent de fièvre, alors que ce n'est pas le cas du CIS.

Si vous constatez les symptômes décrits ci-contre et que l'on vous soigne pour une mastite (traitement par antibiotiques), retournez chez votre médecin si les anomalies sont encore présentes après une semaine.

Un CIS est rarement détectable par les examens classiques de mammographie ou d'échographie. Un prélèvement pour analyse au microscope est généralement nécessaire pour diagnostiquer un cancer inflammatoire du sein. Ensuite, un bilan d'extension sera réalisé ainsi que des examens complémentaires pour déterminer la meilleure combinaison possible de traitements.

